

历年真题试卷（六）

一、单项选择题（每一考题下面有 A、B、C、D、E 五个备选答案，请从中选择一个最佳答案，每题 1.5 分，共 180 分）。

- 1.系统理论中最基本的观点是
A.层次性 B.相关性 C.整体性
D.动态性 E.静态性
- 2.下列有关“罗伊适应模式”的描述，正确的是
A.人是一个适应系统，只具有生物属性
B.效应者适应表现在生理功能和自我概念
C.适应性反应是指人能够不断适应而保持健康
D.人是一个适应系统，具有生物和社会属性
E.人是通过生理调节维持身体平衡而达到适应的
- 3.某老年患者住院后，经过治疗护理已进入恢复期，但其仍然事事需要护士帮助，否则自己不敢活动，此患者出现的问题可能是
A.患者行为角色紧张 B.患者角色行为强化 C.患者角色行为消退
D.患者角色行为缺如 E.患者角色行为适应
- 4.一患者准备上午出院，早上查房时，突然发生了心跳骤停，经抢救无效死亡。对此，该医院应如何处置
A.应负刑事责任 B.应负民事责任 C.应负刑事责任、民事责任和行政责任
D.该情况不属于医疗事故，不需承担责任 E.应负行政责任
- 5.发生车祸事故的自救和他救属于
A.日常健康行为 B.避免有害环境行为 C.预警行为
D.求医行为 E.保健行为
- 6.下列关于护患关系的理解不正确的是
A.护患关系是一种帮助与被帮助的关系 B.护患关系是一种治疗关系
C.护患关系是以护士为中心的关系 D.护患关系是在护理活动中形成的
E.护患关系是多方面、多层面的专业性互动关系
- 7.刘女士，36 岁，近来工作中遇到困难，为了保持心情愉快，有时间就出去逛街、购物，有意识不去想烦恼的事，她的行为在心理适应防卫机制中属于
A.否认 B.压抑 C.补偿
D.转移 E.升华
- 8.李先生，55 岁，脑血管意外，长期卧床，无自理能力，根据奥瑞姆的自理模式，这时护士提供的护理应属于
A.全补偿系统 B.部分补偿系统 C.支持补偿系统
D.教育补偿系统 E.辅助补偿系统
- 9.某幼儿 2 岁，穿裤子时经常两腿穿入同一裤腿，其妈妈时常给予斥责，根据艾瑞克森的心理社会发展理论，其长大后可能产生的危机是

天任考研

- A.勤奋对自卑 B.亲密对孤独 C.自主对羞愧
D.完善对失望 E.自我认同对角色混乱
- 10.在纽曼的健康系统模式中，调节病室的温湿度属于
A.三级预防 B.一级预防 C.二级预防
D.促进舒适 E.维持健康
- 11.护理记录单常采用PIO形式，其中“O”代表的意义是
A.健康问题 B.护理诊断 C.护理目标
D.护理计划实施的效果 E.护理措施
- 12.应用评判性思维解决临床问题时，护士独立地分析和检验选择问题，依据具体问题进行分析决定，这种判断属于评判性思维的哪个层次
A.尽职层次 B.基础层次 C.分析层次
D.复杂层次 E.认知层次
- 13.患者王某，女，61岁，高血压，脑卒中，右侧肢体感觉障碍，给患者50℃水温的热水袋，其目的是避免
A.温度性损伤 B.医源性损伤 C.压力性损伤
D.生物性损伤 E.放射性损伤
- 14.不适宜支气管哮喘患者康复的住院环境是
A.室温在20℃左右 B.病室光线明亮 C.相对湿度为60%
D.定时开窗通风 E.室内放置鲜花
- 15.对患者进行入院介绍和指导的内容不包括
A.病室及病区环境 B.床单位及设备的使用方法
C.医院的规章制度 D.医院的作息时间 E.常规标本的送检方法
- 16.对仰卧中凹位的描述不正确的是
A.适用于休克患者 B.有利于静脉回流 C.抬高头胸部30~45°
D.有利于保持气道通畅 E.抬高下肢20~30°
- 17.心包积液的患者应取的体位是
A.去枕仰卧位 B.半坐卧位 C.头高足低位
D.端坐位 E.头低足高位
- 18.为昏迷患者做口腔护理不必准备的用物是
A.石蜡油 B.吸水管 C.压舌板
D.治疗碗 E.弯血管钳
- 19.保护具应用于
A.大手术后患者 B.谵妄、躁动患者 C.不配合治疗者
D.咯血患者 E.休克患者
- 20.梦游是一种睡眠失调，主要见于
A.老年人 B.中年人 C.青年人
D.儿童 E.婴儿
- 21.穿隔离衣至哪一环节手开始污染

- A.手提衣领取下隔离衣 B.穿衣袖 C.系领口
D.系袖口 E.系腰带
- 22.患者王某，男，67岁。因心力衰竭卧床已有2周，护士在为其做皮肤护理时应注意选用
A.盆浴 B.清洗头面部 C.淋浴
D.足浴 E.床上擦浴
- 23.大气污染中无刺激作用的有害气体是
A.二氧化硫 B.氯气 C.一氧化碳
D.臭氧 E.烟尘
- 24.外地患者李某，在出差途中，不幸患肝炎住院，他需将自己的生病情况告知家人，他的信件用何种方法处理后寄出
A.高压蒸汽灭菌 B.甲醛熏蒸法 C.用氯胺液喷雾
D.用紫外线照射 E.过氧乙酸擦拭
- 25.为女患者导尿时铺好洞巾后，消毒尿道口及小阴唇的顺序为
A.自上而下，由内向外 B.自上而下，由外向内 C.自下而上，由内向外
D.自下而上，由外向内 E.尿道口外螺旋式消毒两次
- 26.青霉素注射液需现用现配，其目的除防止药液在室温下效价迅速降低外主要是
A.避免放置久，被细菌污染 B.避免药液变色、沉淀
C.避免发生过敏反应 D.减轻注射时疼痛
E.防止注射局部产生硬结
- 27.病情观察中应做到“五勤”，下列哪项不符
A.勤巡视 B.勤动手 C.勤询问
D.勤思考 E.勤记录
- 28.患者王某，女，20岁。溺水，被救出时呼吸、心跳已停止，立即由二人行心肺复苏术，人工呼吸与胸外心脏按压的比例为
A.2: 15 B.2: 20 C.2: 25
D.2: 30 E.2: 35
- 29.瞳孔缩小见于
A.有机磷农药中毒患者 B.阿托品中毒患者 C.颅脑损伤患者
D.脑肿瘤患者 E.濒死患者
- 30.关节活动范围是指关节运动时所通过的运动弧。关节活动范围练习简称为
A.ROM B.REM C.RCM
D.RDM E.NREM
- 31.空气栓塞时患者死亡的原因是空气阻塞了
A.上腔静脉入口 B.肺动脉入口 C.肺静脉入口
D.脉动脉 E.主动脉入口
- 32.判断瞳孔散大的标准是直径大于
A.2mm B.3mm C.4mm
D.5mm E.6mm

- 33.下列属于长期备用医嘱的是
- A.低蛋白饮食 B.测血压 q6h C.甲喹酮（安眠酮）0.2g 口服 SOS
D.哌替啶 50mg 肌内注射 Prn E.吸氧
- 34.肝昏迷的患者禁用何种溶液灌肠
- A.等渗盐水 B.肥皂水 C.等渗冰盐水
D.碳酸氢钠水 E.温开水
- 35.患者出现哪种异常脉搏，需同时测心率和脉率
- A.间歇脉 B.速脉 C.不规则脉
D.三联律 E.绌脉
- 36.患者，男，55岁，因关节疼痛需每日红外线照射一次，在照射过程中观察皮肤出现紫红色，此时护士应该
- A.停止照射，改用热敷 B.立即停止照射，涂抹凡士林保护皮肤
C.适当降低温度，继续照射 D.改用小功率灯，继续照射
E.改用大功率灯，继续照射
- 37.伴有高血压的慢性肾脏疾病患者，高血压发生的机制主要为
- A.肾素水平明显升高 B.血管紧张素 I 增高 C.血管紧张素 II 增高
D.水钠潴留 E.以上都不是
- 38.患者，女，30岁，腰痛、尿频、尿急，血压：160/100mmHg，尿蛋白（+），红细胞 8~10个/HP，白细胞 15~20个/HP，静脉肾盂造影：右肾缩小，肾盏扩张。最可能的诊断是
- A.慢性肾炎 B.慢性肾盂肾炎 C.多囊肾
D.肾结核 E.肾盂积水
- 39.患者，男，56岁，因消化道出血住院，血压为 60/30mmHg，心率为 140次/分，血红蛋白为 35g/L，经输液治疗后，血压恢复至 100/70mmHg，心率 100次/分，但患者 3天来少尿查血钾：6.4mmol/L，BUN：28.5mmol/L，以下处理原则哪项正确
- A.加大输血量 B.紧急血液透析 C.继续输血
D.口服氨苯蝶啶和双氢克尿噻 E.西地兰 0.4mg 缓慢静脉静推
- 40.肾盂肾炎患者的饮食护理应是
- A.多食蛋白质，少饮水 B.限制蛋白质饮食，少饮水
C.适当饮食，多饮水 D.适当饮食，少饮水
E.限制蛋白质饮食，多饮水
- 41.老年患者，常于夜间发作哮喘，伴频繁咳嗽，咳出粉红色泡沫痰，有时带有血性，双肺底闻及湿性啰音。以下哪一种疾病诊断可能性大
- A.心源性哮喘 B.支气管哮喘 C.过敏性肺炎
D.肺癌 E.喘息性支气管炎
- 42.关于急性呼吸衰竭的处理哪项正确
- A.为维持气道通畅应尽早作气管切开 B.持续吸入 40%氧气可预防氧中毒
C.氧疗应使 PaO₂ 维持在接近正常水平 D.宜尽早使用呼吸兴奋剂
E.当 pH<7.20 时应给予乳酸钠纠正酸中毒

43.患者，男，近10年来活动性气短逐渐加重，现不能和正常人一样走路，X线检查：肺野清晰，肺功能：FEV1/FVC为65%，残气率为45%，观察患者呼气时鼓腮吹气。患者采取这种呼吸方式的最主要的道理是

- A.自然习惯
- B.增加肺容量以改善气体交换
- C.增加呼气阻力，防止气道闭陷
- D.因鼻腔有病，经鼻呼气不畅所致
- E.用力加强呼吸的结果

44.患者，女，60岁，两日来高热寒战，咳嗽，咯痰带血丝，胸痛。体检：体温37°C，面色灰白，皮肤湿冷，口唇紫绀，左上肺叩诊浊音，呼吸音弱，少许湿啰音，心率128次/分，血压70/50mmHg。应立即采取的措施是

- A.拍胸部X线片
- B.查白细胞+分类
- C.痰培养+药敏试验
- D.输液+血管活性药物
- E.心电图检查

45.患者，女，24岁，一周来低热、乏力、胸痛、气促。体检：右胸叩诊实音，呼吸音消失。胸水常规草黄色，比重为1.030，WBC： $0.8 \times 10^9/L$ ，淋巴占80%，蛋白为34g/L，LDH：300u/dl，胸水LDH/血清LDH比值为0.75。最可能的诊断是

- A.右侧肺炎伴胸水
- B.肺癌伴胸膜转移
- C.肝硬化伴胸水
- D.慢性肾功能不全伴胸水
- E.结核性胸膜炎

46.患者，男，48岁，患支气管哮喘病史20多年，近10年来加重，无明显缓解期并出现喘憋，活动后症状更为明显。为评定肺功能，应选择的最主要的检查项目是

- A.弥散功能测定
- B.肺活量测定
- C.动脉血气分析
- D.FEV1
- E.残气容积测定

47.患者，男，55岁，患慢性支气管炎、阻塞性肺气肿，近日犯病，2h前突然左胸部刺痛，呼吸困难加重，为明确诊断，最适当的检查应选

- A.心电图
- B.肺部B超
- C.胸部X线检查
- D.肺部CT
- E.血气分析

48.下列哪项不符合弥漫性间质性肺疾病的表现

- A.干咳
- B.气急
- C.杵状指
- D.X线胸片呈弥漫性炎变
- E.肺功能呈阻塞性通气功能障碍

49.类风湿关节炎患者出现急性关节疼痛时，不应采取的护理措施是

- A.卧床休息
- B.取功能位
- C.功能锻炼
- D.必要时肢体固定
- E.足下放置足板，避免垂足

50.过敏性紫癜最常见的类型是

- A.单纯型
- B.腹型
- C.关节型
- D.肾型
- E.混合型

51.系统性红斑狼疮患者不正确的皮肤护理是

- A.常用清水清洗
- B.忌用碱性肥皂
- C.忌用化妆品
- D.每日用50°C水局部湿敷
- E.避免阳光暴晒

52.心动过缓患者应避免用力排便等屏气用力动作，其目的是

- A.防止血压增高
- B.防止血压降低
- C.防止诱发心动过速

- D.防止加重心动过缓 E.节省体力
- 53.对于心肌梗死 (MI), 下列哪种说法最正确
- A.血清 CPK 正常可排除 MI B.血清 CPK 增高程度不能反映梗死范围
C.ECG 正常不能排除 MI D.心向量图诊断 MI 不如 ECG 敏感
E.无病理性 Q 波 MI 都是累及心室壁全层
- 54.某女性患者, 28 岁, 血压持续升高: 25.33/16.00kPa (190/120mmHg), B 超和腹部 X 线检查结果为右肾明显缩小。应首先选择以下哪项检查明确诊断
- A.测定血浆肾素与儿茶酚胺含量 B.快速联系静脉肾盂造影
C.肾动脉造影 D.反复多次尿培养及肾功能检查
E.肾脏区计算机断层 X 线摄影
- 55.风心病二尖瓣狭窄患者最常见的并发症是
- A.脑栓塞 B.阵发性心动过速 C.亚急性感染性心内膜炎
D.心房颤动 E.过早搏动
- 56.患者, 男, 40 岁, 肥胖, 吸烟 15 年, 每当劳累即感胸骨后压榨性疼痛, 查心电图正常。医生应怎样嘱咐患者才是最合适的
- A.戒烟 B.减轻体重 C.卧床休息
D.不需治疗 E.住院诊治
- 57.患者, 男, 20 岁, 经常感冒, 最近有心悸, 不能平卧, 下肢水肿。体检: 颈静脉稍充盈, 心界轻度扩大, 心尖部第一心音减低, 有病理性第二心音和杂音。诊断最可能为
- A.急性风湿热 B.病毒性心肌炎 C.结核性心包积液
D.冠心病心衰 E.肥厚性梗阻性心肌病
- 58.关于肥厚性梗阻性心肌病的心脏杂音特点说法正确的一项是
- A.前倾坐位呼气末杂音增强 B.蹲位变起立位屏气时杂音减弱
C.右侧卧位吸气时杂音增强 D.下蹲位吸气时杂音减弱
E.前倾卧位吸气时杂音增强
- 59.以下哪种情况最适合洋地黄治疗指征
- A.缩窄性心包炎伴肝大、腹水 B.甲亢伴心动过速
C.急性风湿热伴心动过速 D.房颤伴心室率快及心力衰竭
E.肺心病伴心力衰竭
- 60.患者, 男, 48 岁, 既往有冠心病史, 于熟睡中突感心前区痛, 持续 30min, 心电图 v1-V5ST 段抬高, 室性期前收缩, 1h 后复查心电图正常, 最可能诊断是
- A.急性广泛前壁心肌梗死 B.急性心包炎 C.变异型心绞痛
D.卧位型心绞痛 E.心脏神经症
- 61.在急性糜烂性胃炎的病因中, 下列哪项是错误的
- A.大面积烧伤 B.颅内病变 C.创伤和/或休克
D.受凉和/或进食不当 E.重危疾病或器官衰竭
- 62.患者, 男, 45 岁, 乙型肝炎 30 年, 近 2 个月来, 乏力腹泻, 睡眠倒置, 性格与前不同, 易急躁。化验: GPT 为 125U, A/G: 2.5/3.2; B 超显示: 肝回声不均匀、增强, 门静脉内径

为 1.6cm，少量腹水。下列哪项是最正确的

- A.服镇静药、卧床休息
- B.应用抗生素控制腹泻
- C.不必用降血氨药物
- D.积极应用利尿剂
- E.禁止蛋白质饮食

63.下列哪项不是肝性脑病的诱发因素

- A.口服安体舒通
- B.便秘
- C.低钾
- D.感染
- E.腹泻

64.有关幽门螺旋杆菌下列哪种说法不正确

- A.是革兰阴性杆菌
- B.产生尿毒酶，促进氢离子逆弥散
- C.是厌氧菌
- D.对胃黏膜有侵袭
- E.产生局部免疫反应

65.患者，男，40岁，患高血压3年，今晨突然呕鲜血800ml伴血块，继之排柏油便两次，血压140/100mmHg，脉搏110次/分，肝肋下未及，脾肋下2cm，腹部移动性浊音阳性。请指出下列治疗措施中哪项是错误的

- A.三腔二囊管压迫止血
- B.PAMBA 静脉滴注
- C.垂体后叶素静脉滴注
- D.输新鲜血
- E.先晶体后胶体为输液原则

66.呕吐严重且呕吐量大的疾病是

- A.急性胃炎
- B.肠梗阻
- C.幽门梗阻
- D.急性阑尾炎
- E.急性胆囊炎

67.评估急性胰腺炎患者的病情，哪项最能说明预后不佳

- A.体温 39° C
- B.黄疸
- C.合并代谢性酸中毒
- D.全腹压痛、腹肌紧张
- E.手足抽搐

68.需绝对禁食的情况是

- A.十二指肠溃疡合并黑便
- B.肝性脑病前驱期
- C.胃溃疡大便隐血试验持续阳性
- D.消化性溃疡合并幽门梗阻
- E.急性水肿型胰腺炎

69.患者，女，38岁，间断发作下腹部疼痛伴腹泻3年，排便4~5次/天，脓血便，便后疼痛有缓解。曾行结肠镜检查见黏膜充血、糜烂及浅表小溃疡。此患者最可能的诊断是

- A.细菌性痢疾
- B.肠道菌群失调
- C.肠易激综合征
- D.溃疡性结肠炎
- E.结肠癌

70.患者甲状腺摄¹³¹I率增高，且高峰前移，提示其疾病为

- A.地方性甲状腺肿
- B.单纯性甲状腺肿
- C.甲状腺炎
- D.甲状腺自主高功能腺瘤
- E.淋巴细胞性甲状腺炎

71.患者，男，30岁，Graves病患者，晨起时出现双下肢不能动弹，神志清楚，无肌肉萎缩。下列哪种疾病可能性最大

- A.脑血管意外
- B.甲状腺功能亢进性肌病
- C.周围神经炎
- D.皮肌炎
- E.甲亢性周期性瘫痪

72.患者，男，65岁，疲倦乏力、食欲下降4个月。实验室检查血浆ACTH增高、尿17-羟及17-酮皮质醇增高，血皮质醇增高，失去昼夜节律，低血钾碱中毒，小剂量及大剂量地塞米松均不能抑制。其最可能的病因是

- A.Cushing 病 B.肾上腺瘤 C.异位 ACTH 综合征
 D.肾上腺癌 E.患者擅自服用糖皮质激素
- 73.成人女性血红蛋白正常参考值范围是
 A.100~140g/L B.110~150g/L C.120~160g/L
 D.140~170g/L E.170~200g/L
- 74.再生障碍性贫血一般不出现
 A.网织红细胞减少 B.红细胞形态改变 C.红细胞减少
 D.白细胞减少 E.血小板减少
- 75.某白血病患者，高热伴抽搐，适宜的降温措施是
 A.温水擦浴 B.冰水灌肠 C.酒精擦浴
 D.口服退热药 E.头部放冰袋
- 76.某患者血小板 $5.0 \times 10^9/L$ ，出血时间 5 分钟，红细胞计数 $4.0 \times 10^{12}/L$ ，白细胞计数 $5.0 \times 10^9/L$ ，网织红细胞 1%。应考虑
 A.再生障碍性贫血 B.血小板减少性紫癜 C.过敏性紫癜
 D.白血病 E.粒细胞减少症
- 77.肢体可脱离床面，但不能抵抗阻力，此时的肌力为
 A.0 级 B.1 级 C.2 级
 D.3 级 E.4 级
- 78.抗癫痫药物需服用多久
 A.完全控制发作后即可停药 B.完全控制发作后再持续服药 3~6 个月
 C.完全控制发作后再持续服药 1~2 年 D.完全控制发作后再持续服药 3~5 年
 E.终生服药
- 79.关于昏迷患者的护理估计，以下哪项不对
 A.脑出血昏迷发生急骤 B.尿毒症昏迷发生急骤 C.颅内占位性病变昏迷前伴头痛、呕吐
 D.颅内感染昏迷先有发热 E.低血糖昏迷患者出汗多
- 80.患者，男，58 岁。身高 165cm，体重 76kg。体检时发现空腹血糖 6.7mmol/L，下列哪项考虑是正确的
 A.可诊断为糖尿病 B.应进行口服 75g 葡萄糖耐量试验
 C.应进行口服 100g 葡萄糖耐量试验 D.可诊断为无症状性糖尿病
 E.可排除糖尿病
- 81.预防肠道传染病的措施中，应以哪一环节为主
 A.接触者预防服药 B.隔离治疗带菌者 C.疫苗预防接种
 D.切断传播途径 E.以上都不是
- 82.霍乱的常见表现为
 A.先泻后吐 B.先吐后泻 C.只泻不吐
 D.只吐不泻 E.以上都不是
- 83.下列哪组血清学检查结果提示乙型肝炎有较大的传染性
 A.抗-HBc (+) B.HBsAg (+), HBeAg (-), 抗-HBc (+)

天任考研

C.HBsAg (+), 抗-HBe (-)

D.HBsAg (+), HBeAg (+)

E.HBsAg (+)

84.患者,男,25岁,1型糖尿病患者。病程8年,平时应用混合胰岛素治疗,分别在早餐前和晚餐前皮下注射。近2周监测血糖发现空腹血糖在8.2~11.7mmol/L,中餐前为8.0mmol/L,晚餐前为7.6mmol/L,临睡前为5.1mmol/L,为了良好地控制空腹血糖,应选择下列哪项措施

- A.可能是黎明现象,可在晚餐前增加长效胰岛素剂量
- B.可能是晚餐前胰岛素用量不足,可增加晚餐前胰岛素剂量
- C.可能是Somogyi现象,应减少晚餐前胰岛素剂量
- D.可能是Somogyi现象,应先多次测定夜间血糖,然后调整胰岛素剂量
- E.应减少晚餐的进餐量

85.成年男性体液的分布下列哪项正确

- A.占体重的比例大于小儿
- B.占体重的比例少于成年女性
- C.占体重的55%
- D.占体重的60%
- E.占体重的75%

86.高钾血症致心律失常可静脉注射

- A.等渗盐水
- B.平衡盐液
- C.10%葡萄糖液
- D.10%葡萄糖酸钙液
- E.5%碳酸氢钠

87.失血性休克患者,经输血2500ml后,血压为80/50mmHg,尿量为30ml/h,中心静脉压为15cmH₂O,提示

- A.血容量不足
- B.心功能不全
- C.周围血管扩张
- D.静脉过度收缩
- E.肾功能不全

88.哪一种麻醉前用药能预防局麻药的毒性反应

- A.哌替啶
- B.吗啡
- C.苯巴比妥钠
- D.阿托品
- E.东莨菪碱

89.休克早期血压变化是

- A.收缩压增高,舒张压增高,脉压变小
- B.收缩压正常,舒张压增高,脉压变小
- C.收缩压下降,舒张压增高,脉压变小
- D.收缩压及舒张压均无变化
- E.收缩压及舒张压均下降

90.手术进行中,下列哪项不符合无菌原则

- A.手术人员双手不可下垂超过腰以下
- B.不可从手术者背后递送器械
- C.所铺无菌单要有两层
- D.术中如手套接触到非无菌区,应立即更换
- E.无菌区的布单有沾湿时,应加铺盖上无菌巾

91.关于破伤风患者的护理中下列哪项是错误的

- A.保持病室安静,室内光线宜柔和,以免刺激打扰患者
- B.应用大剂量青霉素控制感染

- C.镇静、解痉、防止患者抽搐和减轻肌肉张力
D.应将伤口敞开，清除坏死组织，用3%双氧水冲洗
E.破伤风抗毒素皮试阳性，则不能使用破伤风抗毒素，以免发生意外
- 92.某烧伤患者，II~III度总面积25%，其中III度烧伤面积为19%，严重程度是
A.轻度烧伤 B.中度烧伤 C.重度烧伤
D.特重烧伤 E.以上都不是
- 93.一般择期手术的患者麻醉前需禁饮水的时间为
A.12h B.8h C.4h
D.2h E.1h
- 94.喉上神经内侧支损伤会出现的症状是
A.呼吸困难 B.声调降低 C.饮水呛咳
D.声音嘶哑 E.吞咽困难
- 95.患者，女，40岁，近2个月来间断出现右侧乳头血性溢液，局部无明显红、肿、热、痛，挤压乳头时血性溢液增多，乳房内未扪及肿块。首先考虑的疾病是
A.乳房纤维腺瘤 B.乳腺囊性增生病 C.乳癌
D.乳管内乳头状瘤 E.急性乳房炎
- 96.患者，男，68岁，右侧腹股沟区可复性肿块7年，肿块有时可进入阴囊。体检：有腹股沟区肿块，可还纳，外环口容二指，压迫内环后，肿块不再出现。鉴别其是腹股沟斜疝还是直疝，最有意义的鉴别点是
A.发病年龄
B.突出途径
C.疝块形状
D.疝内容物是否进入阴囊
E.还纳疝内容物、压迫深环后疝内容物是否再突出
- 97.急性腹膜炎时预防膈下感染的有效措施是
A.禁食 B.腹腔引流 C.半卧位
D.补液维持水电解质平衡E.应用抗生素
- 98.患者，男，42岁，被汽车撞击左上腹部后收住院，住院期间下床活动时出现腹痛、面色苍白、出冷汗。体温37.5°C，脉搏120次/分，血压80/60mmHg，腹部压痛、反跳痛和移动性浊音(+)，腹腔穿刺抽出不凝血，此时该患者最重要的护理诊断是
A.焦虑 B.疼痛 C.休克
D.有感染的危险 E.体液不足
- 99.胃大部切除术后4d，当患者进食后上腹饱胀和呕吐。呕吐物为食物，无胆汁。目前最可能发生的并发症是
A.十二指肠残端破裂 B.吻合口近侧空肠段梗阻
C.倾倒综合征 D.吻合口梗阻 E.吻合口远侧空肠段梗阻
- 100.肠梗阻患者，胃肠减压流出血性液体应警惕
A.胃出血 B.食管出血 C.咽部出血

- D.鼻出血 E.绞窄性肠梗阻
- 101.以下护士关于肠梗阻患者的观察和判断正确的是
- A.呕吐呈喷射状说明是麻痹性肠梗阻
B.呕吐早、频繁，且含有胆汁，应为高位肠梗阻
C.腹痛一段时间后有所减轻，且肠鸣音不再亢进说明梗阻症状减轻
D.阵发性腹痛转为持续性胀痛说明发生了绞窄性肠梗阻
E.发病后患者有一次排便，说明是不完全性梗阻
- 102.下列关于高位性肠痿的描述正确的是
- A.以营养不良为主要表现 B.以继发感染为主要表现
C.水电解质丢失较少 D.全身病理改变较轻
E.多为高流量痿
- 103.患者，女，30岁，因急性阑尾炎穿孔行阑尾切除术，术后5d，感腹部持续性胀痛，伴恶心呕吐，无排便排气。体检：全腹膨隆，未见肠形，肠鸣音消失，全腹未触及肿块。X线片见小肠、结肠充气及气液平面。以上情况应如何处理
- A.立即剖腹探查 B.腹腔穿刺、灌洗 C.钡灌肠
D.钡餐全胃肠道透视 E.胃肠减压、支持疗法
- 104.引起急性阑尾炎最重要的原因是
- A.胃肠功能紊乱 B.阑尾壁痉挛 C.肠内大肠杆菌繁殖
D.阑尾动脉缺血 E.阑尾腔机械性梗阻
- 105.关于结肠造口患者术后灌洗的描述，下列正确的是
- A.量约2000ml B.水温37~40℃ C.灌洗30min左右
D.灌洗间隔约1周 E.灌洗液全部注入以后即可开放灌洗带，排出肠内容物
- 106.关于门静脉高压症的腹水产生原因，下列哪一项是错误的
- A.门静脉系统毛细血管的滤过压增加 B.肝功能损害，血浆白蛋白减少
C.体内醛固酮增加 D.体内抗利尿激素增加E.以上都不是
- 107.确诊胃癌最有效的检查方法是
- A.连续大便隐血试验 B.X线钡餐检查 C.气钡双重对比造影检查
D.纤维胃镜检查 E.胃液分析
- 108.原发性肝癌最早出现的转移方式是
- A.侵犯门静脉分支，经门静脉系统形成肝内播散B.肝外血行转移 C.淋巴转移
D.腹腔种植 E.直接向横膈蔓延
- 109.患者，男，62岁，大隐静脉曲张，行大隐静脉高位结扎加剥脱术，关于术后的护理措施，下列错误的是
- A.做足趾伸曲运动 B.弹力绷带包扎患肢 C.术后3~4d方可下床活动
D.患肢抬高30cm E.弹力绷带维持2周方可拆除
- 110.硬脑膜外血肿晚期瞳孔的变化是
- A.双侧瞳孔散大 B.伤侧瞳孔缩小 C.对侧瞳孔散大
D.伤侧瞳孔散大 E.对侧瞳孔缩小

- 111.张力性气胸急救的首先措施是
- A.胸膜腔闭式引流排气减压
B.粗针头于伤侧第二肋间锁骨中线刺入胸膜腔
C.尽早剖胸探查，修补裂口
D.使用足量抗生素防治感染
E.以上都不是
- 112.患者，女，29岁，既往体健。暴饮暴食后突然出现上腹剧痛，频繁呕吐，面色苍白，疑为急性胰腺炎。患者最适宜的处理为
- A.普食
B.禁食
C.要素饮食
D.低脂流食
E.高蛋白流食
- (113~114题)患者，男，70岁，前列腺增生14年，排尿困难，每天夜间排尿约3次，睡眠差，近来常不能控制排尿而尿湿衣裤。
- 113.该患者的尿失禁类型是
- A.压力性尿失禁
B.充溢性尿失禁
C.急迫性尿失禁
D.完全性尿失禁
E.真性尿失禁
- 114.目前患者存在的护理问题不包括下列的
- A.自我形象紊乱
B.焦虑
C.睡眠形态紊乱
D.尿潴留
E.排尿形态改变
- 115.骨盆骨折合并尿道损伤时，易损伤尿道的
- A.球部
B.阴茎部
C.尿道外口
D.膜部
E.尿道内口
- 116.关于髌关节后脱位哪项不正确
- A.局部明显疼痛
B.髌部呈屈曲、内收、内旋畸形
C.伤肢弹性固定
D.伤肢长度相对延长
E.臀部呈异常隆起，有时合并坐骨神经损伤
- 117.患者，男，25岁，C5-6骨折合并四肢瘫痪，无感染病灶出现高热。下列护理措施中错误的是
- A.调节室温
B.冰水擦浴
C.通风
D.冰水灌肠
E.药物降温
- 118.患者，女，71岁，诊断为脊髓型颈椎病。下列陈述中不适当的是
- A.可引起截瘫
B.可导致大小便失禁
C.早期可行按摩牵引治疗
D.早期应手术治疗
E.MRI可见脊髓受压
- 119.急性血源性骨髓炎好发于下列哪个年龄段
- A.1~3岁
B.3~15岁
C.15~25岁
D.25~40岁
E.40岁以上
- 120.关于截瘫患者留置尿管的护理，下列哪项有错误
- A.嘱患者多饮水
B.每4h开放一次尿管
C.每日用3%硼酸水冲洗尿管2次
D.隔日更换尿管一次
E.严格遵守无菌操作

二、多项选择题（每一考题下面有 A、B、C、D、E 五个备选答案，请从中选择两个或两个以上的最佳答案，多选、漏选、错选均不得分，每题 2 分，共 60 分）。

1.影响需要满足的因素有

- A.个性、知识因素
- B.环境因素
- C.信仰与价值因素
- D.生理因素
- E.情绪因素

2.下列属于防范医疗事故的措施的是

- A.做好护理的书写和管理
- B.保持医疗设备良好的状态
- C.加强学习，提高业务技术水平
- D.加强职业道德的教育
- E.改善医院硬件设施

3.奥瑞姆的自护理论包括的相关理论结构是

- A.自护理论结构
- B.补偿理论结构
- C.自我护理缺陷理论结构
- D.护理系统理论结构
- E.支持—教育理论结构

4.为疼痛患者实施止痛措施时正确的是

- A.药物止痛
- B.当患者出现明显疼痛时，护士才可采用止痛措施
- C.对中等程度疼痛的患者，可采用非麻醉性止痛药
- D.疼痛原因未明，禁止使用任何镇痛药
- E.给药 20~30min 后，须评估和记录镇痛效果及副作用

5.患者活动受限的原因有

- A.疼痛
- B.严重疾病
- C.神经功能受损
- D.某些医护措施的执行
- E.身体残疾

6.禁忌使用热疗法的是

- A.各种脏器出血
- B.腰肌劳损
- C.外踝扭伤 48h 内
- D.面部危险三角区的感染
- E.未明确诊断的急性腹痛

7.下呼吸道感染的常见因素为

- A.免疫功能受损
- B.正常菌群失调
- C.病原体的飞沫传播
- D.空调系统污染
- E.致病菌通道逆行感染

8.临床死亡期的特征包括

- A.心跳停止
- B.呼吸停止
- C.反射消失
- D.瞳孔散大
- E.脑干以上部位处于深度抑制状态

9.急性阑尾炎患者术后，采用半坐卧位的目的是

- A.减轻腹胀
- B.减轻伤口缝合处张力
- C.缓解疼痛
- D.减少术后出血
- E.利于腹腔引流，使感染局限化

10.急性肾衰竭患者可出现的电解质酸碱平衡紊乱的情况有

- A.代谢性酸中毒
- B.高钠血症
- C.低钙血症
- D.高钾血症
- E.高磷血症

11.缩唇呼吸时，下列哪项措施正确

- A.加快呼气
- B.吸气时收腹
- C.用鼻吸气

- D.用口呼气 E.呼气与吸气的时间比为 3: 1
- 12.关于痰液的体位引流哪些正确
- A.确定引流体位最重要 B.引流通常在餐后进行, 每日 2~3 次
- C.每次引流时间不超过 30min D.为加强引流效果, 引流时辅以胸部叩
- E.应尽可能让家人参与引流过程
- 13.室上性心动过速的心电图特点为
- A.连续 3 个以上的室上性早搏 B.节律在 160~220 次/分
- C.节律齐 D.QRS 波群时间<0.10s
- E.有继发性 S-T 段改变
- 14.护士在应用硝酸甘油过程中正确的护理措施是
- A.在静滴过程中应注意滴速并密切观察血压
- B.口服给药时应指导患者饭后温水吞服, 以减轻胃肠道刺激
- C.如患者服用后疼痛在 3~5min 内仍不缓解应再服 1 片
- D.告知患者药物见光易分解, 应放在棕色瓶内保存
- E.口服制剂应半年更换 1 次, 以确保疗效
- 15.对类风湿关节炎患者正确的护理是
- A.活动期卧床休息 B.避免光照 C.避免关节受压
- D.避免患肢活动 E.做好心理护理
- 16.肝性脑病发病相关的因素有
- A.假神经递质 B.支链氨基酸增多 C.血氨增高
- D.芳香氨基酸减少 E.五羟色胺产生增多
- 17.门静脉高压症的临床表现为
- A.腹水 B.脾大、脾功能亢进 C.肝掌
- D.腹壁脐周静脉曲张 E.蜘蛛痣
- 18.目前认为艾滋病的传播途径不包括
- A.性传播 B.静脉滥用毒品而传播 C.输血
- D.昆虫叮咬传播 E.与艾滋病患者共同进餐
- 19.糖皮质激素的生理功能是
- A.参与物质代谢、水盐代谢 B.参与应激反应 C.增强免疫功能
- D.抗炎、抗过敏作用 E.抗毒和抗休克作用
- 20.再障的诊断标准包括
- A.全血减少 B.网织红细胞小于 0.01 C.淋巴细胞增高
- D.肝、脾肿大 E.骨髓多部位增生减低
- 21.何谓医院感染
- A.医院内获得性感染
- B.患者在入院时处于潜伏期但在医院内发生的感染
- C.包括在医院内获得而于出院后发病的感染
- D.医院的环境污染

- E.医院内的传染性疾
- 22.关于休克的预防，下列叙述错误的是
- A.对严重损伤患者，急救时要注意止痛、止血、固定骨折
 - B.汽车运送患者时，头向车头，足向车尾
 - C.增强患者抗病能力
 - D.控制原发病灶
 - E.预防过敏反应
- 23.下列哪些符合手术中的无菌原则
- A.双手下垂在腰部以上，传递器械在手术者前面进行
 - B.前臂、肘部被参观者接触时应套以无菌袖套
 - C.手术人员需调换位置时，一人应退后一步，面对面的转身调换，以免污染
 - D.被盖的无菌布单浸湿后，应立即在上面再复盖一块手术巾
 - E.在切开皮肤及缝合之前，应再用 70%酒精消毒一遍
- 24.关于急性腹膜炎非手术疗法的护理正确的是
- A.定时测体温、脉搏、呼吸、血压
 - B.注意观察腹部体征的演变趋势
 - C.一般取半卧位，使用大剂量抗生素控制感染
 - D.流质饮食并采用胃肠减压，记录液体出入量
 - E.静脉输液、输血，纠正水、电解质及酸碱失衡
- 25.患者，女，61岁，因胆总管结石并发胆管炎行“胆总管切开取石+T型管引流术”，关于T形管引流的注意事项，下列正确的有
- A.引流装置应保持无菌
 - B.注意勿使“T”形管脱落
 - C.观察引流瓶记录引流液的量和性质
 - D.肠鸣音恢复后即拔管
 - E.保持引流管通畅
- 26.抗菌药物的不合理应用表现在诸多方面
- A.无指征的预防用药
 - B.无指征的治疗用药
 - C.抗菌药物品种、剂量的选择错误
 - D.给药途径、给药次数不合理
 - E.疗程不合理
- 27.关于冬眠低温疗法护理的注意事项中正确的是
- A.需要专人守护
 - B.用药前要测体温、脉搏、呼吸、血压和瞳孔
 - C.先降温再用冬眠药物
 - D.降温标准以维持直肠温度在 32~34° C 为宜
 - E.用药后每 0.5~1h 应观测一次生命体征、瞳孔和意识
- 28.严重梗阻性黄疸的患者，下列哪些术前准备是正确的
- A.纠正水、电解质平衡失调
 - B.应用抗生素控制炎症
 - C.纠正酸碱平衡紊乱
 - D.有出血倾向的患者应口服维生素 K
 - E.保肝治疗
- 29.骨折患者在石膏绷带包扎过程中，正确的护理是

- A.对骨骼隆突部位应加衬垫，以免石膏绷带硬固后受压
- B.如有伤口应先更换敷料，伤口处需在石膏未干固之前开窗
- C.石膏绷带包扎后，应将肢体垫好软枕，10~20min 内保持不动
- D.包扎时要暴露手指、足趾，以便观察肢体的血运感觉和活动度
- E.以上都正确

30.关于大隐静脉剥脱术后的护理下列叙述正确的是

- A.卧床休息，患肢放平
- B.弹力绷带包扎 1~2 周
- C.鼓励患者早期活动患肢
- D.术后 48h 可下床活动
- E.应注意观察患肢有无出血、肿胀及疼痛

三、问答题（每题 20 分，共 60 分）

1.患者皮某，男，36 岁。因脑外伤而入院。体检：昏迷，体温 37.9°C，脉搏 82 次/分，呼吸 20 次/分。请回答：

- (1) 患者不能由口进食，可采取何种饮食护理措施？（3 分）
- (2) 其目的是什么？（3 分）
- (3) 在护理操作中应注意些什么？（14 分）

2.患者，女，32 岁，多食、多汗、易怒 1 年，劳累后心慌、气短 2 个月。1 年前与家人生气后，感心慌，易饥，食量由原来的 250g/d 增至 500g/d，同时怕热多汗，说话多，易怒、失眠，逐渐发现双眼突出，梳头困难，蹲下站起时困难，在当地医院查 T₃ 为 600ng/dl（RIA 法），T₄ 为 20.5mg/dl，TSH<0.015IU/ml，给予口服他巴唑 30mg/d，分 3 次口服，1 个月后病情好转，半年前自行停药。2 个月前再次出现多汗、多食，劳累后心慌、气短明显，夜间阵发性呼吸困难。病后大便每日 2 次，成形便，体重减轻 8kg。既往体健，近一年闭经。体检：体温 37°C，脉搏 110 次/分，呼吸 26 次/分，血压 110/60mmHg，消瘦，皮肤潮湿，眼球突出，闭合障碍，双侧甲状腺Ⅱ度对称肿大，质软，无结节，两上极可及震颤，可闻血管杂音，无颈静脉怒张，双肺正常，心界稍向左扩大，心率为 150 次/分，心音不整，律不齐，心尖部可闻及Ⅱ/6 级收缩期杂音，腹软，无压痛，肝脾肋下未及，双下肢不肿，双膝、跟腱反射亢进，双 Babinski 征（-）。请回答：

- (1) 请列出可能的医疗诊断。（6 分）
- (2) 为进一步明确诊断需做哪些检查（列出 2 项即可）。（5 分）
- (3) 针对患者“活动后心慌、气短、夜间阵发性呼吸困难”提出相应的护理诊断及护理措施。（9 分）
- (4) 该患者的治疗原则是什么？（5 分）
- (5) 该患者潜在何种内分泌危象的并发症？请制定发生危象时相应的护理措施（9 分）

3.患者，刘某，男，49 岁，因“腰痛伴下肢痛”入院。患者因早年工作因素出现腰痛，曾在当地医院就诊，给予药物治疗，疼痛减轻；数月后疼痛加剧，药物治疗无效，又去当地医院，查 MRI 显示，L₄₋₅、L₅-S₁ 椎间盘突出，腰椎退行性改变，给予传统物理治疗，虽有好转却不持久，反复发作。近 2 个月，腰部疼痛加剧且伴随同侧腿疼，遂来我院治疗。入院后即完善相关检查，血尿常规正常，凝血功能正常。CT 显示：L₄₋₅、L₅-S₁ 椎间盘组织变性，向后突出，后纵韧带及黄韧带增厚。入院诊断为“腰椎间盘突出症”。

请回答：

- (1) 请列出患者目前存在的主要护理诊断及医护合作性问题。(5分)
- (2) 入院后拟行后路颈椎板间开窗髓核切除术，请根据病情制定术前的护理计划。(5分)
- (3) 手术后第3天，患者引流管引流出淡红色液体，约400ml，切口敷料渗湿。患者发生了哪种并发症?(2分)
- (4) 简述术后的主要护理措施。(8分)
- (5) 术后患者应如何进行功能锻炼?(8分)